

Programma intensivo di alimentazione Sostitutivo del latte per vitello Schils (Alimentazione con secchio)



Settimana	Dosaggio g/l	Litro/pasto	Pasto/Giorno	Commenti
Giorno 1-2	Colostro	1,50 *	Fino a 4 volte	Rapidità, Qualità, Quantità
Giorno 3-7	140	1,50 – 2,00	(da 2 a) 3	Dal 5° giorno: acqua
2	140	2,50 – 3,00	2	Acqua, Concentrato
3	140	3,50 – 4,00	2	Acqua, Concentrato. Fieno/Paglia
4 - 6	140	3,50 – 4,00	2	Acqua, Concentrato. Fieno/Paglia
7	140	3,00	2	Acqua, Concentrato. Fieno/Paglia
8	140	2,50	2	Acqua, Concentrato. Fieno/Paglia
9	140	2,00	2	Acqua, Concentrato. Fieno/Paglia
10	140	2,00	1	Acqua, Concentrato. Fieno/Paglia

***se possibile, somministrare 4 litri di Colostro entro le prime 6 ore di vita**

Importante:

- Miscelare il sostitutivo del latte (CMR) con acqua ad una temperatura di 45° - 50°C
- Temperatura di somministrazione : tra 38° e 42°C
- Il volume totale è molto importante per la giusta concentrazione!!
Per esempio: 1 litro di CMR = 140 gr polvere + 860 ml acqua
- Fornire acqua fresca e pulita ogni giorno
- Se la temperatura ambientale scende al di sotto dei 0°C , aumentare la dose del mangime di circa il 10% per vitello/al giorno.

Il programma di alimentazione è raccomandato. Lo sviluppo e la condizione degli animali è l'indicatore più importante !!



Schils

Schils bv
Dr. Nolenslaan 121
6136 GM Sittard
The Netherlands
T +31 (0)46 45 99 900
F +31 (0)45 45 99 999
Info@schils.com
www.schils.com